



**TALİMATLAR**  
**SOLÜSYONLARIN YANLIŞ**  
**ZERKİNİ ÖNLEME**  
**TALİMATI**

Yayın Tarihi	01/03/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	21/02/2011
Revizyon No	03
Sayfa No	1/1
Talimat No	03

- Antiseptik solüsyonlar ile anestezi solüsyonların hastaya zerkinde solüsyonların karışmasını önlemek için:
- Anestezi solüsyonlar 2 cc 'lık dental enjektörlere çekilerek her hekimin masasına dağıtılır.
- Hekim talebinde antiseptik solüsyonlar 5 cc 'lık enjektörlere çekilerek hekime verilir.
- Polikliniklerde alkol %70, sodyum hipoklorit (NaClO)'in % 5 oranında sulandırılarak muhafaza edilmesi sağlanır.
- Şişe üzerine hazırlanan solüsyonun adı , hazırlama ve son kullanma tarihi yazılır.
- Cam şişe içinde hazırlanan solüsyonların (baticon,çamaşır suyu v.s) ışık almaması için koyu renkli ışık geçirmeyen kağıtlarla kaplanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM